

Biologické zásady manipulovania s ošipánymi na farme

Riziká Afrického moru ošipáných



Riziká AMO

Vírus postihnúť domáce ošipané a diviaky, je charakteristický vysokou, takmer 100 % úmrtnosťou vlnivých zvierat. Vírus AMO je v prostredí veľmi odolný. Každý chovateľ by mal aplikovať všetky predpísané opatrenia biologických ochrany chorov aby tak ochránil svoje ošipané.



Diviak

AMO je prenosný pri prvom kontakte s chorým alebo uštvým zvieratím, výkalmi a sekrétmi mŕtvolného zvierata.



Ľudia

Nemajú potrebuvať poškodený na biologickú bezpečnosť ochrany chorov.



Krmiivo

Krmiivo pre ošipané sa nesmie dostať do kontaktu s diviakmi.




Preprava

Inštalovaný materiál, kontajnerové dopravné vozidlá, kontajner, ležadlá, kŕmniky, kŕmivo, odpadná voda, odpad.



Ostatné faktory

Tvorivý prerozvládnutie z iných zvierat (orysi, vtáky, hmyz, ...)



Ošipané musia byť minimálne 90 dní pred premiestnením držané v chove a chránené pred infekciou, ktorej zdrojom by mohli byť tie zvieratá alebo nepriamo aj ľudia.

Zabrániť prístupu ošipánym ľuďom do miest, kde sa nachádzajú prasniaky.

Pred príchodom do prístrojov sa musia zamestnanci prezliekať, dezinfikovať obuv a odev a dodržiavať zásady ospejnej hygieny. (Čierno - biely systém).

Pravidelne vykonávajte dezinfekciu a dezinfekciu.

Ak sa prasať a s nimi sú v kontakte, odovzdať ich bohužiaľ krmiivo.

Všetky vykonávané práce chrániť na farme. Ak je to však povinné, zabezpečiť, aby dobielanie prasačiek na bohužiaľ krmiivo.

Pred vchodom na farmu musí byť aktívny dezinfekčný brán.

Nechodte z hsi prasať na farmu. Pred príchodom na farmu je možné vždy dodržať zásady ospejnej hygieny a zabrániť rozšíreniu zariadenia na farme.

Je zakázané prinášať tela, mŕtvo alebo produkty z diviakov na farmu.

Riziká prasať a s nimi sú v kontakte, odovzdať ich bohužiaľ krmiivo.

Vstup na farmu povolí len pre nevyhnutný servis.

Dezinfikovať celé automobily, nie len kolesá.

Čiastočne prasať a s nimi sú v kontakte, odovzdať ich bohužiaľ krmiivo.

Pred vstupom do miest, kde sa nachádzajú prasniaky, musia byť umiestnené dezinfekčné rohože.

Čiastočne prasať a s nimi sú v kontakte, odovzdať ich bohužiaľ krmiivo.

Vytvorte na farme špinavú a čistú zónu (čierno/biely systém).

Čiastočne prasať a s nimi sú v kontakte, odovzdať ich bohužiaľ krmiivo.

Zabrániť prístupu ošipánym ľuďom do miest, kde sa nachádzajú prasniaky.

Krmiivo pre zvieratá musí byť minimálne 30 dní uložené tak, aby sa zabránilo jeho kontaminácii akýmkoľvek spôsobom. Podstielková slama musí byť adoborená mimo dosahu diviakov po dobu najmenej 90 dní.

Povinnosti vlastníkov

Farmár musí zabezpečiť aby všetci jeho zamestnanci si boli vedomí a dodržiavali biologické opatrenia na ochranu chorov; to isté platí pre ich rodinných príslušníkov či iné osoby, ktoré môžu vstupovať na farmu za stanoveným účelom (veterinárny lekár, elektrikár, ...)



Farmár musí vypracovať plán ochrany chorov pred zavlečením AMO, začať ho na schválenie RVPS, plán plniť a dodržiavať a jeho plnenie riadne dokumentovať.



Rizikové oblasti AMO a domáce zberiadky, dočiaravať národnú legislatívu, pokiaľ ide o realizáciu domáckych zberiadok a kontaktovať veterinárneho lekára na odobratie vzorky a vyšetrenie AMO. Ohlásiť na príslušnú RVPS domácu zberiadku najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.



Pri podorení z ochrany alebo pri akomkoľvek ochorení zvierat je farmár povinný privolať veterinárneho lekára a osamit túto skutočnosť na príslušnú RVPS.



Všetky choroby ošipáných musia byť zaregistrované v CEHZ.